Alcohols & Phenols

الكحولات والفينولات

لصيغة العامة الكحولات : **ROH**
 المجموعة الوظيفية : مجموعة الهيدروكسيل.

This is the functional group of an alcohol

R-OH
Alcohol

Ar-OH
Phenol

* تعتبر الكحولات من مشتقات الماء بسبب استبدال ذرة هيدروجين واحدة من الماء
 بمجموعة الكيلية واحدة وكذا مشتاق من الهيدروكربونات

التصنيف الكحولات

• 1- تبعاً لعدد مجموعات الهيدروكسيل:

• أحادية الهيدروكسيل، الصيغة العامة $C_nH_{2n+2}O$:

مثاله: **الكحول الميثيلي**

• ثنائية الهيدروكسيل، الصيغة العامة $C_nH_{2n+2}O_2$:

مثاله: **الجليكول**

• ثلاثية الهيدروكسيل، الصيغة العامة $C_nH_{2n+2}O_3$:

مثاله: **الجلسرين أو الجلسرول**

• عديدة الهيدروكسيل، الصيغة العامة $C_nH_{2n+2}O_x$:

مثاله: **الجلوكوز**

2- تنقسم الكحولات وفقا لعدد ذرات الكربون المرتبطة بذرة الكربون التي تحمل مجموعة الهيدروكسيل الى:-

1- كحول أولي:

ويكون الكحول أولياً إذا كانت مجموعة (- OH) على أول ذرة كربون في الكحول وترتبط بذرتين هيدروجين ومجموعة الكيل واحدة. ويسمى الكحول حينئذ **كحولا أوليا** الصيغة العامة $R-CH_2-OH$ ∴

2- كحول ثانوي

ويكون الكحول ثانوياً إذا كانت مجموعة (- OH) على أي ذرة كربون عدا الأولى. وتكون الكربونه المتصله بالهيدروكسيل تحمل ذرة هيدروجين واحدة ومجموعتين ألكيل ويسمى الكحول حينئذ **ثانويا** الصيغة العامة $R_2-CH-OH$

3- كحول ثالثي

يكون الكحول ثالثيا إذا كانت مجموعة الهيدروكسيل على ذرة الكربون المرتبطة بدورها بثلاث ذرات كربون أخرى (بثلاث مجموعات الكيل أو أريل) الصيغة العامة R_3-C-OH :

3. **Primary** (1°), **secondary** (2°), or **tertiary** (3°) alcohols:

Ethyl alcohol
(a 1° alcohol)

كحول ايثيلي

Geraniol

(a 1° alcohol with the odor of roses)

Benzyl alcohol
(a 1° alcohol)

كحول بينزيلي

2ميثيل بروبانول-2

كحولات ثالثة

2 - ميثيل - 2 - بنتانول
كحول ثالثي

• فالكحولات الثلاث الآتية لها صيغة مجملة وهي إيزوميرات الوضع

• $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

بوتانول-1

بوتانول - 2

2ميثيل بروبانول-2

Nomenclature

• 1) Common Nomenclature التسمية الشائعة

يذكر اسم مجموعة الالكيل المرتبطة بذرة الهيدروكسيل و ثم يتبع الاسم بلفظ كحول

Alkyl + alcohol

E t h y l a l c o h o l

الكحول الايثيلي

propyl alcohol

الكحول بروبيلي

V i n y l a l c o h o l

فينيل الكحول

Butyl alcohol

الكحول بيوتيلي

A l l y l a l c o h o l

sec-Butyl alcohol

ثانوي بيوتيل الكحول

- الكحولات التي تحتوي على مجموعتين هيدروكسيل تسمى جليكولات ولكن بنظام الايوباك تسمى دايول

Ethylene glycol
1,2-Ethanediol

Propylene glycol
1,2-Propanediol

Trimethylene glycol
1,3-Propanediol

2) IUPAC Nomenclature

- اختر أطول سلسلة كربونية مرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل.
- رقم السلسلة من الطرف الأقرب لمجموعة الهيدروكسيل.
- تتم الإشارة إلى مجموعة (مجموعات) (الألكيل) أو (الآريل) المتفرعة ورقم ذرة الكربون المتصلة بكل منها
- ضع رقم ذرة الكربون المرتبطة بمجموعة الهيدروكسيل إن لزم الأمر (إذا زاد عدد ذرات الكربون عن ذرتان).

- : تتم تسمية الكحولات بإضافة المقطع (ول) إلى اسم الألكان المناظر

- بعد تحديد موقع مجموعة الهيدروكسيل
- (بكتابة رقم ذرة الكربون المتصلة بها) نكتب علامة (-) ثم اسم الألكان + المقطع (ول) وذلك بعد كتابة أسماء جميع التفرعات

1-Propanol

1-پروبانول

2-Butanol

2-بیوتانول

4-Methyl-1-pentanol

(not 2-methyl-5-pentanol)

4-میٹیل - 1-پینتanol

3-Chloro-1-propanol

3-کلورو-1-پروبانول

4,4-Dimethyl-2-pentanol

4,4-ٹائی میٹیل - 2-پینتanol

- 4- الأفضلية لمجموعة الهيدروكسيل على الروابط الثنائية والثلاثية في الترقيم

5-Hepten-2-ol

notice the removal of the (e)

- 5- إذا كان المركب يحتوي على مجموعته هيدروكسيل ورابطة مزدوجة او ثلاثية نختار السلسلة التي تحتوي على المجموعتين حتى ولو لم تكن الأطول

3-ايبثيل -3-بيوتين-2- اول

2- برومين-1-ول

2-Cyclohexanol

3 -سیکلوہکسینول

5-Chloro-4-methyl-octan-1-ol

5-کلورو-4-میٹیل- اوکتان-1-ول

3-Bromo-2-phenylcyclopentanol

3-برمو-2-فینیل سیکلوپنتانول

3-Butyn-1-ol

3 - بیوتاین-1-اول

Benzyl alcohol

Nomenclature of Phenols تسمية الفينولات

- 2- المركبات التي تتصل بمجموعة الهيدروكسيل مباشرة بحلقة البنزين تسمى فينولات

Phenol

فينول

3 - Chlorophenol

3-كلورو فينول

***p*-Methylphenol (*p*-Cresol)**

بارا-ميثيل فينول (بارا كريزول)

- Methyl phenols are commonly called as cresols

• میٹیل فینول دائما یسہی کریزول

IUPAC name 2 - Methylphenol

Common name o-Cresol

3 - Methylphenol

m-Cresol

4 - Methylphenol

p-Cresol

4-امينو فينول
او بارا امينو فينول

4 - A m i n o p h e n o l
o r p - A m i n o p h e n o l

Catechol

Resorcinol

Hydroquinone

Pyrogallol

الخواص الفيزيائية للكحولات

- متعادلة التأثير على ورقة عباد الشمس
- الأفراد الأولى سوائل تمتزج امتزاج تام بالماء
- الأفراد المتوسطة زيتية القوام
- الأفراد العليا مواد جامدة ذات قوام شمعي
- الكحولات ضعيفة الحامضية
- الكحولات مركبات قطبية لارتفاع **السالبية الكهربائية** للأكسجين عن ذرتي الكربون والهيدروجين،

تابع الخواص الفيزيائية للكحولات

* الذوبان في الماء

- ذوبان الكحولات في الماء مرتفعة، لأن الماء **مركب قطبي** ووبالتالي يكون روابط هيدروجينية بين جزيئاته والكحول
- وتقل الذوبانية في الماء بارتفاع الكتلة الجزيئية, بسبب زيادة الجزء الهيدروكربوني غير القطبي فيها.

توجد روابط هيدروجينية بين جزيئات الأغوال

علل تقل قابلية الكحولات للذوبان في الماء بزيادة الوزن الجزيئي؟

لأن زيادة الوزن الجزيئي للكحول تؤدي إلى زيادة الجزء الهيدروكربوني وهو جزء غير قطبي على حساب مجموعة الهيدروكسيل وهو الجزء القطبي وبالتالي يشغل الجزء الهيدروكربوني حيزا كبيرا فيستوعب المذيب كمية قليلة من المحلول

- الكحولات لديها درجة غليان عالية نسبيا ذا ما قورنت بالهيدروكربونات التي لها نفس الكتلة المولية.
- درجة غليان الكحولات تزداد كلما زادت الكتلة الجزيئية بسبب زيادة قوى التجاذب بين الجزيئات.
- كلما زادت عدد مجموعات الهيدروكسيل كلما زادت الذوبانية وذاذت درجة الغليان

علل درجة غليان الكحولات عالية نسبيا ذا ما قورنت بالهيدروكربونات

- بسبب وجود مجموعة الهيدروكسيل القطبية التي تكون روابط هيدروجينية بين جزيئات الكحول وبعضها وبالمثل وجود روابط قطبية بين الأكسجين والكربون
- كل ذلك يؤدي إلى زيادة كمية الطاقة اللازمة لفصل هذه الجزيئات عن بعضها وبذلك ترتفع درجة الغليان في الكحول عن الألكان المقابل
- أما الألكان المقابل فلا يوجد به روابط هيدروجينية وبالتالي تكون درجة غليانه منخفضة

علل درجة غليان الجليسرول أعلى من درجة غليان الإيثانول؟

نظرا لأن الجليسرول به ثلاث مجموعات هيدروكسيل تكون روابط هيدروجينية بين جزيئاته أقوى من الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الكحول الإيثيلي فبالتالي كمية الطاقة اللازمة لكسر الروابط بين جزيئات الجليسرول أكبر من كمية الطاقة اللازمة لتكسير الروابط بين جزيئات الإيثانول

الطرق العامة لتحضير الكحولات

1. من الألكينات

بإضافة البورون إلى الألكينات , وكذلك أكسدتها بواسطة البرمنجنات أو إضافة مركبات الزئبق وانتزاعها أو إضافة الماء إليها

❖ عند تفاعل الألكينات مع الماء في وجود وسط حامضي يستخدم غالبا حمض الكبريتيك وتتم الاضافة طبقا لقاعدة ماركوفنيكوف

❖ أكسده الألكينات بواسطة البرمنجنات

إضافة الهيدروكسيل في نفس الاتجاه

س: من البروبلين كيف نحصل على الكحول الأيزوبروبيلي

طريقة أخرى

3. التحلل المائي لهاليدات الألكيل

التحلل المائي لهاليدات الألكيل- مثل كلوريد أو بروميد أو يوديد الألكيل -حيث يتم التحلل المائي لهاليد الألكيل بواسطة محلول مائي مركز ساخن من الصودا الكاوية أو البوتاسا الكاوية حتى درجة الغليان 0 حيث تستبدل ذرة الهالوجين بمجموعة هيدروكسيل

أ- تحضير كحول أولي من هاليد ألكيل أولي

ب- تحضير كحول ثانوي من هاليد ألكيل ثانوي

ج- تحضير كحول ثالثي من هاليد ألكيل ثالثي

ملحوظة

- القدرة على تحلل الماء تتوقف على طبيعة الهالوجين - ترتيب الهالوجينات حسب سهولة انتزاعها من هاليد الألكيل $\text{I} > \text{Br} > \text{Cl}$

علل يفضل يوديد الألكيل عند تحضير الكحولات من هاليدات الألكيل؟

- لسهولة تحللها عن البروميديات أو الكلوريدات وذلك لأن اليود أقل نشاط من البروم و الكلور فيسهل كسر الرابطة بين ذرة اليود وشق الألكيل فتكون أسهل في التحلل

4- اختزال الالدهيدات والكيتونات والاحماض الكربوكسيلية

والدهيد يحتوي على الصيغة البنائية

الصيغة البنائية للكيتونات هي:

الصيغة البنائية للأحماض الكربوكسيلية هي:

في هذه الصيغة, مجموعة R, R' يمكن تكون أليفاتيه أو أروماتية. الالدهيدات والكيتونات والأحماض الكربونية يتم اختزالها بواسطة متراكبات مثل هيدريد الليثيوم الألمنيوم (LiAlH₄) أو بوروهيدريد الصوديوم (NaBH₄).

بيوتانال

بيوتانول - 1

بيوتانون - 2

أختزال الالدهيدات تعطي كحول أولي

اختزال الكيتونات تعطي كحول ثانوي

● من تفاعل جرينيارد مع الالدهيدات أو الكيتونات

يعتمد نوع الكحول المحضر وفقاً لهذه الطريقة على نوع المركب الكربونيلي الذي يتفاعل مع كاشف جرينيارد

الفورمالدهيد ← كحول أولي

الألدهيدات الأخرى ← كحول ثانوي

الكيتون والأستر ← كحول ثالثة

1) Dry ether

2) H₂O

1) Dry ether

2) H₂O

Preparation of Phenols تحضير الفينولات

Reactions of Alcohols and Phenols

تفاعلات الكحولات والفينولات

اولا تفاعلات خاصة بهيدروجين مجموعة الهيدروكسيل

1. حامضية الكحولات والفينولات

• نتيجة للسالبية الكهربائية لذرة الأوكسجين , فالكحولات ضعيفة الحامضية (pKa (16-18).

-تحل الفلزات النشطة مثل الصوديوم والبوتاسيوم محل هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل ويتكون :كوكسيد الفلز ويتصاعد غاز الهيدروجين مثل تفاعلها مع الماء

ميثوكسيد الصوديوم

إيثوكسيد البوتاسيوم

يتحلل الكوكسيد مائيا معطيا الكحول و هيدروكسيد الصوديوم

Acidity of Alcohols & Phenols

- علل عند إضافة الصوديوم على الكحول الإيثيل يتصاعد غاز الهيدروجين؟
لأن الصوديوم يحل محل هيدروجين مجموعة الهيدروكسيل ويتكون إيثوكسيد الصوديوم

- يشتعل الهيدروجين بلهب أزرق مع سماع فرقعة
- الكحولات والفينولات لها خواص حامضية ضعيفة.
- الفينولات أكثر حامضية من الكحولات.

sodium phenoxide فينوكسيد الصوديوم

Ester formation

2. تكوين الإستر

- أ- بطريق مباشر عن طريق تفاعل الكحول مع الحمض العضوي في وجود حمض الكبريتيك لمنع حدوث التفاعل العكسي لأنه يمتص الماء

- يخرج في هذا التفاعل ذرة **هيدروجين** من جزء الكحول ومجموعة **هيدروكسيل** من جزء الحمض لتكوين جزيء الماء تبين ذلك عندما عولج الكحول الذي يحتوى على نظير الأكسجين الثقيل O^{18} بحمض الخليك الذي يحتوى على نظير الأكسجين العادي O^{16} وجد الماء الناتج يحتوى على نظير الأكسجين العادي O^{16}

علل يضاف حمض الكبريتيك المركز عند تفاعل الإيثانول مع حمض الخليك؟
 لأن حمض الكبريتيك يمتص الماء ويمنع التفاعل العكسي

2- Dehydration انتزاع الماء من الكحولات

ثانيا تفاعلات خاصة بمجموعة الهيدروكسيل

4. التفاعل مع هاليدات الهيدروجين

نظرا لاحتواء الكحولات على مجموعة هيدروكسيل فإنها تتفاعل مع **الأحماض الهالوجينية** وحمض الكبريتيك المركز حيث يتفاعل الايثانول مع حمض الهيدروكلوريك المركز في وجود **كلوريد الخارصين** كعامل حفاز لتكوين كلوريد ايثيل وماء

● اختبار لوكس

- يستخدم للتمييز الكحولات الذائبة في الماء إذا كانت كحولات أولية أو ثانوية أو ثالثية
- وهذا الكاشف عباره عن حمض الهيدروكلوريك المركز مذاب فيه **كلوريد الخارصين**
- ويتم الكشف عنها انواع الكحولات والتفرقة بين الثلاثة أنواع بتفاعلها مع كاشف لوكاس ($ZnCl_2 + HCl$) حيث تنفصل طبقة زيتية من هاليد الألكايل الثلاثي بسرعة عند تفاعل كاشف لوكس مع الكحول الثلاثي وبالتسخين مع الكحول الثانوي ولا يحدث تفاعل مع الكحول الأولي.

ثالثا تفاعلات خاصة بمجموعة الكاربينول • الأوكسدة

تتأكسد الكحولات سريعا بالعوامل المؤكسدة مثل حمض الكروميك وهو خليط من حمض الكبريتيك المركز وثاني كرومات البوتاسيوم

أكسدة الكحولات الأولية

يتأكسد على خطوتين وينتج في الخطوة الأولى ألدهيد والثانية حمض

أكسدة الكحولات الثانوية

يتكون مركب غير ثابت في الخطوة الأولى ويتكون الأسيطون في الخطوة الثانية بعد فقد جزيء ماء

الكحولات الثالثية لا تتأكسد

ملحوظة

حمض الكروميك يؤكسد الكحول الأولي والثانوي إلى الألدهيدات والكيتونات.

أما البرمنجنات فتؤكسد الكحولات الأولية إلى أحماض كربوكسيلية أما الثانوية إلى كيتونات

Phenol

p-Benzoquinone

Hydroquinone

6- Reaction of aromatic ring of phenols